

За 4 дня до исследования необходимо соблюдать диету СТРОГО!!!!

Можно: мясо, рыба, молочные продукты, яйца

СТРОГО НЕЛЬЗЯ: ВСЯ растительная пища. (овощи, фрукты, каши, орехи, супы и ВСЕ, что содержит растительную пищу в любом виде), алкоголь, газированные напитки

При проведении исследования после 12.00

Накануне исследования завтрак по диете. **Больше есть ничего нельзя.** Можно пить воду, молоко, чай в неограниченном количестве.

Мовипреп. (Не использовать при весе пациента более 100кг)

Накануне с 19.00 до 23.00 выпить 1 литр препарата. (пакет А + Пакет Б смешать в 1 литре теплой воды) и 1 литр воды

В день исследования выпить за 2 часа еще 1 литр препарата (пакет А + Пакет Б смешать в 1 литре теплой воды). Закончить пить препарат необходимо за 5 часов до начала исследования. (например: исследование назначено на 15.00, соответственно препарат необходимо закончить пить в 10.00. Начать необходимо за 2 часа, т.е. в 8.00). Больше в день исследования ничего не пить и не есть.

Фортранс

При весе пациента до 100кг

Накануне с 19.00 до 23.00 выпить 2 литра препарата (1 пакет на 1 литр воды)

Параллельно с приемом препарата можно пить воду, ОСВЕТЛЕННЫЙ яблочный сок (НЕ ВМЕСТО).

Так же препарат можно мешать с ОСВЕТЛЕННЫМ яблочным соком. 500мл воды, 500 мл сока на 1 пакет. В день исследования выпить за 2 часа еще 2 литра препарата (1 пакет на 1 литр воды)

Закончить пить препарат необходимо за 5 часов до начала исследования. (например: исследование назначено на 15.00, соответственно препарат необходимо закончить пить в 10.00. Начать необходимо за 2 часа, т.е. в 8.00). Больше в день исследования ничего не пить и не есть.

При весе пациента от 100 до 120 кг. Накануне с 18.00 до 23.00 выпить 3 литра препарата (1 пакет на 1 литр воды)

Параллельно с приемом препарата можно пить воду, ОСВЕТЛЕННЫЙ яблочный сок (НЕ ВМЕСТО).

Так же препарат можно мешать с ОСВЕТЛЕННЫМ яблочным соком. 500мл воды, 500 мл сока на 1 пакет.

В день исследования выпить за 2 часа еще 2 литра препарата (1 пакет на 1 литр воды)

Закончить пить препарат необходимо за 5 часов до начала исследования. (например: исследование назначено на 15.00, соответственно препарат необходимо закончить пить в 10.00. Начать необходимо за 2 часа, т.е. в 8.00). Больше в день исследования ничего не пить и не есть.

При весе пациента свыше 120кг. Накануне с 17.00 до 23.00 выпить 4 литра препарата (1 пакет на 1 литр воды). Параллельно с приемом препарата можно пить воду, ОСВЕТЛЕННЫЙ яблочный сок (НЕ ВМЕСТО). Так же препарат можно мешать с ОСВЕТЛЕННЫМ яблочным соком. 500мл воды, 500 мл сока на 1 пакет. В день исследования выпить за 2 часа еще 2 литра препарата (1 пакет на 1 литр воды). Закончить пить препарат необходимо за 5 часов до начала исследования. (например: исследование назначено на 15.00, соответственно препарат необходимо закончить пить в 10.00. Начать необходимо за 2 часа, т.е. в 8.00). Больше в день исследования ничего не пить и не есть.

Эзиклен

Накануне. С 19.00 до 23.00. Налить 1 бутылку препарата в мерную емкость (идет в комплекте) и долить доверху водой, выпить этот раствор примерно за 30-40 минут. Далее выпить 2 литра воды.

В день исследования. Налить 1 бутылку препарата в мерную емкость (идет в комплекте) и долить доверху водой, выпить этот раствор примерно за 30-40 минут. Далее выпить 1.5 литра воды. Закончить пить весь объем жидкости необходимо за 5 часов до начала исследования. (например: исследование назначено на 15.00, соответственно препарат необходимо закончить пить в 10.00. Начать необходимо за 2.5 часа, т.е. в 7.30). Больше в день исследования ничего не пить и не есть.

Лавакол.

С 19.00 до 23.00 выпить 8 пакетов раствора. 1 пакет на 1 кружку воды (примерно 200мл). Параллельно с приемом препарата можно пить воду, ОСВЕТЛЕННЫЙ яблочный сок. (НЕ ВМЕСТО).

В день исследования за 2 часа выпить 7 пакетов раствора. 1 пакет на 1 кружку воды (примерно 200мл). Закончить пить препарат необходимо за 5 часов до начала исследования. (например: исследование назначено на 15.00, соответственно препарат необходимо закончить пить в 10.00. Начать необходимо за 2 часа, т.е. в 8.00). Больше в день исследования ничего не пить и не есть.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПРОСТЫНЬ (НЕ ПЕЛЕНКУ, НЕ ПОЛОТЕНЦЕ). СМЕННУЮ ОБУВЬ.